

مدخلك إلى

روكسينس® (ريتوكسيماب)



البدء بعلاج روكسينس

قد صُممت هذه النشرة للإجابة على أسئلتك ومساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من العلاج الذي تتلقاه.

من المهم أن نقرأ هذه النشرة وأن تحتفظ بها في المتناول لمساعدتك على فهم علاجك. ومن المهم أيضاً أن تكون صريحاً مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك عن كيف تسير أمور علاجك. تحدث معهم عندما يوجد لديك أي أسئلة أو مخاوف حول الخطة العلاجية.


لَمْ يُسْتخدَم روكسينس؟

إن روكسينس هو دواء قابل للحقن يُستخدم لتقليل علامات التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) وأعراضه بالاشتراك مع ميثوتريكسات. ويُستخدم روكسينس أيضاً بالاشتراك مع الهرمونات القشرية السكرية أو "الستيرويدات" لتقليل الالتهاب المرتبط بالورام الحبيبي الشديد المصاحب لالتهاب الأوعية (GPA)، ويُسمى أيضاً ورام حبيبي ويغزري) والتهاب الأوعية المجهرية (MPA) ويساعد في السيطرة على المرض لديك.

كيف يعمل روكسينس؟

تُدّ الخلايا البائية عنصراً هاماً في الجهاز المناعي، حيث تساعد الجسم على مقاومة العدوى. ومع ذلك، يتصرف الجهاز المناعي بطريقة غير طبيعية في أمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) والورام الحبيبي المصاحب لالتهاب الأوعية/التهاب الأوعية المجهرية. وقد يؤدي هذا إلى حدوث هجوم على الأنسجة الصحية الطبيعية، مثل المفاصل. وفي مرضى الورام الحبيبي المصاحب لالتهاب الأوعية/التهاب الأوعية المجهرية، يمكن أن يهاجم الجهاز المناعي المجرى التنفسي (الجيوب الأنفية، الأنف، والقصبه الهوائية والرئتين)، والكلى، والعينين، والأعصاب والجلد.

إن روكسينس هو جسم مضاد أحادي النسيلة. إن الأجسام المضادة هي بروتينات تُنتج لترتبط ببروتين آخر يسمى المستضد. يرتبط روكسينس بمستضد موجود على سطح أحد أنواع خلايا الدم البيضاء وهو الخلايا اللمفية البائية. عندما يرتبط روكسينس بسطح هذه الخلية، يتسبب في موت الخلية.



ما الأشكال المتوفرة من روكسينس؟

يتوفر روكسينس في صورة محلول سائل معقم في قارورات أحادية الاستعمال. وهو يتوفر بتركيزين:

100 مجم/10 مل (10 مجم/مل)



500 مجم/50 مل (10 مجم/مل)



لا يتم تناول روكسينس عن طريق الفم. إنه يُعطى مع سوائل عن طريق خط وريدي. الخط الوريدي، أو I.V، هو عبارة عن أنبوب بلاستيكي رقيق يُوضع في وريد بيدك أو ذراعك. عند إعطاء روكسينس عن طريق الوريد، يسمى التسريب.

وصف طبيبك روكسينس بعد دراسة حالتك بعناية. قد لا يستفيد الأشخاص الآخرون من تلقي هذا الدواء، على الرغم من أن مشاكلهم الطبية قد تبدو مماثلة لمشاكلك.

قبل بدء التسريب، سَتُعطى أدوية لمنع التفاعلات المحتملة لروكسينس أو الحد منها.

التهاب المفاصل الروماتويدي

تتألف كل دورة علاجية من عمليتي تسريب منفصلتين على أن توجد فترة أسبوعين على الأقل بين الممرتين. تُعد الدورات العلاجية المتكررة باستخدام روكسينس محتملة. حسب علامات وأعراض مرضك، سيقدر طبيبك متى يجب أن تتلقى المزيد من روكسينس.

الورام الحبيبي المصاحب لالتهاب الأوعية/التهاب الأوعية المجهرية
يُعطى روكسينس في صورة تسريب وريدي أسبوعي لمدة 4 أسابيع.

ما الذي يجب علي معرفته قبل تلقي روكسينس؟

لا تستخدم روكسينس إذا كنت تعاني من الحساسية لريتوكسيماب أو البروتينات ذات المصدر المماثل أو أي مكون غير دوائي آخر موجود بروكسينس، أو إذا سبق أن أصبت بعدوى نادرة بالمخ تسمى اعتلال بيبضاء الدماغ متعدد البؤر المتفرقي (PML). لا يُوصى باستخدام روكسينس بين المرضى الذين يعانون من عدوى شديدة نشطة. لا يُوصى بروكسينس ما لم يخضع التهاب المفاصل الروماتويدي المتوسط إلى الشديد لدى المرضى للسيطرة باستخدام الأدوية التي تُسمى مثبطات عامل نخر الورم.

للمساعدة على تجنب الآثار الجانبية وضمان الاستخدام الصحيح، تحدث مع متخصص الرعاية الصحية قبل تلقي روكسينس

تحدث عن أي حالات صحية أو مشاكل ربما تعاني منها، بما في ذلك إذا:

- سبق أن عانيت من رد فعل سيئ لريتوكسيماب أو أي من المكونات غير الدوائية.
 - كنت تعاني من الحساسية لأدوية أخرى، أو الأطعمة أو الصبغات.
 - كان لديك تاريخ مرضي من الإصابة بأمراض القلب، أو النوبات القلبية أو السكتة الدماغية.
 - كنت تتناول أي أدوية أخرى (بما في ذلك تلك الأدوية التي لم يصفها الطبيب). إذا كنت تتناول أو تناولت دواءً حيويًا آخر يسمى مثبطات عامل نخر الورم أو الأدوية المضادة للروماتويد المُعدلة لسير المرض (DMARD). إذا كنت تتناول دواءً لتقليل ضغط الدم. إذا كنت تخطط للتطعيم بلقاح أثناء فترة علاجك بروكسينس أو بعد انتهائها.
 - كنت تعاني من مرض بالرئة موجود مسبقًا حيث قد تكون معرضًا لفرصة أكبر لحدوث مشاكل التنفس أثناء تسريب علاج روكسينس.
 - كان لديك تاريخ مرضي للإصابة بالالتهاب الكبدي ب أو مصاب حاليًا بعدوى الالتهاب الكبدي ب.
 - كان لديك تاريخ مرضي للإصابة بالعدوى المزمنة أو المتكررة.
 - كنت حاملًا، أو تخططين للحمل أو ترضعين طفلاً.
- ستساعد هذه المعلومات طبيبك وتساعدك على اتخاذ القرار بما إذا كان عليك استخدام روكسينس وما هي العناية الزائدة التي عليك اتباعها أثناء تلقي العلاج.



ما هي الآثار الجانبية المحتملة لروكسينس؟

هذه ليست كل الأعراض الجانبية المحتملة التي قد تشعر بها عند تلقي روكسينس. إذا عانيت من أي أعراض جانبية غير مذكورة هنا، فتواصل مع متخصص الرعاية الصحية. أخبر طبيبك، أو الممرضة أو الصيدلي في أقرب وقت ممكن إذا كنت تشعر بأنك لست على ما يرام أثناء تلقك للعلاج باستخدام روكسينس.

الآثار غير المرغوب بها والمحتملة الأكثر شيوعاً هي أحداث مرتبطة بالتسريب:

- الحمى والقشعريرة
- الغثيان، والقيء، والإرهاق (الشعور بالتعب أو الضعف)، والصداع، والطفح الجلدي، واحمرار الجلد، والحكة، والصفير أو الضيق في الصدر، وضيق التنفس، والصعوبة في التنفس، والإحساس بتورم اللسان أو الحلق، وتهيج الحلق، والتهاب الأنف (سيلان الأنف)، وانخفاض ضغط الدم المؤقت، وارتفاع ضغط الدم، والاحمرار، والدوخة عند الوقوف، وسرعة ضربات القلب، وآلم بالصدر، وآلم في الفم/الحلق وتورم اليدين والقدمين.

إذا حدثت هذه الآثار غير المرغوبة، فمن الأكثر شيوعاً أن تحدث خلال فترة تتراوح بين 30 دقيقة وساعتين بعد بدء التسريب الأول لكنها قد تحدث أيضاً بعد انتهاء التسريب. عادةً ما تكون الأعراض من خفيفة إلى متوسطة، والتي يمكن علاجها بسهولة. ومن النادر أن تكون هذه التفاعلات شديدة. تُعد هذه الآثار الجانبية غير المرغوبة أقل شيوعاً بعد العلاج الأول.

ويمكن الوقاية من الآثار غير المرغوب بها أو التعامل معها عن طريق:

- جعل تسريب روكسينس بطيئاً أو إيقافه. يمكن إعادة بدء العلاج بمجرد تلاشي الأعراض.
- إعطاء خافض للحرارة، مثل تايلينول®، أو مضادات الهيستامين، مثل بينادريل®، قبل كل تسريب لروكسينس. في بعض الأحيان يلزم إعطاء أدوية إضافية لعلاج هذه الآثار غير المرغوبة.

وعلاوة على ذلك:

- قد يوجهك طبيبك بعدم تناول دواء ضغط الدم لمدة 12 ساعة قبل تسريب روكسينس وتأجيل تناوله حتى الانتهاء من تسريب روكسينس. يُرجى أن تطلب من طبيبك تعليمات خاصة.
- ولأن بعض الأدوية التي تُعطى مع روكسينس قد تتسبب في بعض الدوخة أو النعاس، عليك الترتيب مع شخص آخر ليقلك إلى المنزل بعد كل مرة للعلاج.

وبالإضافة إلى الآثار غير المرغوبة الموصوفة أعلاه، يوجد أحداث ضائرة معينة محددة على أنها خاصة بمرضى الورام الحبيبي المصاحب لالتهاب الأوعية/التهاب الأوعية المجهرية، وهي التشنجات العضلية، وزيادة في إنزيمات الكبد ونزيف الأنف.

ويوجد أيضاً آثار غير مرغوبة محتملة يمكن أن تكون خطيرة، لكن حدوثها أقل شيوعاً.

يصاب بعض المرضى بالعدوى بعد العلاج. غالباً ما تكون هذه العدوى برءاً، لكن يمكن أن تكون التهاباً رئوياً أو التهابات المسالك البولية. وقد تحدث بعض الآثار الأخرى لكنها أقل احتمالاً، بما في ذلك آلم بالبطن، و/أو الظهر، و/أو الصدر، و/أو العضلات و/أو المفاصل، أو في مكان التسريب، أو الشعور بتوعلك، أو تغيرات في ضغط الدم، أو تغيرات في معدل ضربات القلب، أو الإسهال، أو عسر الهضم، أو تقلص العضلات، أو الدوخة، أو النخز أو التتميل، أو القلق أو العصبية، أو السعال، أو الدماغ أو حكة العينين، أو سيلان الأنف أو حكة الأنف، أو التعرق أو التهاب الجيوب الأنفية.

يعاني بعض المرضى أيضاً من بعض التغيرات بفحوصات الدم، بما في ذلك انخفاض عدد الخلايا الحمراء، أو الخلايا البيضاء أو كليهما. التفاعلات الشديدة لكنها نادرة، على وجه التحديد صعوبة التنفس والتفاعلات الجلدية الشديدة بما في ذلك تبتثر، ويمكن أن تكون مميتة. ولهذا السبب على طبيبك مراقبتك عن قُرب، ولماذا من المهم لك أن تخبر طبيبك على الفور إذا كنت تعاني من أي صعوبة في التنفس وأي تفاعلات جلدية.

يعاني بعض المرضى أيضاً من ضعف متزايد على أحد جانبي الجسم، أو الحماقة أو الوقوع، أو وجود مشكلة بالتفكير أو الذاكرة، أو تغيرات بالحالة المزاجية أو تغير في الرؤية. عليك إبلاغ هذه طبيبك على الفور.

إذا كنت تتلقى روكسينس بالاشتراك مع أدوية أخرى، فقد تكون بعض الآثار الجانبية التي قد تعاني منها بسبب الدواء (الأدوية) الأخر.

للمزيد من المعلومات حول الآثار الجانبية المحتملة لروكسينس، يُرجى الرجوع إلى نشرة معلومات المريض التي يقدمها لك فريق الرعاية الصحية.

تحدث مع متخصص الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعاني من عرض مزعج أو أثر جانبي غير مذكور هنا أو سوء الوضع لدرجة التعارض مع أنشطتك اليومية.

تحذيرات واحتياطات هامة

تُعد عدة آثار جانبية مرتبطة بروكسينس؛ وقد يكون البعض منها خطيرًا ومهددًا للحياة. يجب استخدام هذا العقار فقط من قِبل متخصصي الصحة الذين يتمتعون بخبرة في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي في مكان تتوفر به الأدوية وتدابير الرعاية الداعمة على الفور في حال حدوث تفاعل تحسسي أثناء إعطاء الدواء.

يمكن أن تحدث بعض التفاعلات الخطيرة للتسريب أثناء التسريب أو خلال 24 ساعة بعد تسريب روكسينس.



قد حدثت معاودة عدوى الالتهاب الكبدي الفيروسي ب في المرضى الذين لديهم دليل على وجود الفيروس في فحص الدم. يستحسن خضوع كل المرضى للاختبار لعدوى الالتهاب الكبدي الفيروسي ب قبل بدء العلاج بروكسينس.



يمكن أن تحدث العدوى الخطيرة، بما فيها المميتة، أثناء العلاج باستخدام روكسينس أو بعده. سُجلت عدوى نادرة بالمخ تسمى فيروس جون كوينغام، والذي يتسبب في اعتلال بيضاء الدماغ متعدد البؤر المتفرقي (PML) والوفاة، في المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية الذين يتلقون العلاج باستخدام روكسينس. يصعب توقع من الذي سيصاب باعتلال بيضاء الدماغ متعدد البؤر المتفرقي لكنه أكثر شيوعًا في الأشخاص ذوي الأجهزة المناعية الضعيفة.



وسُجلت تفاعلات جلدية خطيرة، مثل تقشر الأنسجة المتموتة البشروية التسممي (TEN) ومتلازمة متلازمة ستيفنز جونسون (SJS) بدرجة نادرة جدًا. أدت بعض الحالات إلى الوفاة.



سُجلت بدرجة نادرة بعض الأحداث القلبية الوعائية الخطيرة والتي من المحتمل أن تكون مميتة عقب العلاج باستخدام روكسينس.



التحضير لموعدك التالي

من المهم طرح الأسئلة وإخبار فريق الرعاية الصحية إذا كانت لديك أي مخاوف حول علاجك. استخدم المساحة الموجودة أدناه لكتابة أي شيء ترغب في الحديث عنه مع فريقك في أي من زيارتك القادمة.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

معلومات الاتصال بفريق الرعاية الصحية الخاص بي

- | | |
|--------------|-------------------|
| الاسم: _____ | رقم الهاتف: _____ |
| الاسم: _____ | رقم الهاتف: _____ |
| الاسم: _____ | رقم الهاتف: _____ |
| الاسم: _____ | رقم الهاتف: _____ |
| الاسم: _____ | رقم الهاتف: _____ |

الموارد الإضافية

مؤسسة أبحاث التهابات المفاصل (The Arthritis Research Foundation)

تأسست مؤسسة أبحاث التهابات المفاصل عام 1998، وهي تجمع التموليات وتستثمرها لصالح التهابات المفاصل. وبالإضافة إلى ذلك، نسعى لزيادة الوعي بهذا المرض.

توجه إلى www.beatarthritis.ca أو اتصل على 1-416-586-3224.

المركز الكندي لأبحاث التهابات المفاصل

"Arthritis Research Centre of Canada (ARC)"

تُعد أبحاث التهابات المفاصل في كندا أكبر مركز أبحاث سريرية لالتهاب المفاصل في أمريكا الشمالية، وهو مخصص للفهم ومشاركة المعرفة حول أبحاث التهابات المفاصل.

توجه إلى www.arthritisresearch.ca أو اتصل على 1-604-207-0400.

مؤسسة التهابات المفاصل (The Arthritis Foundation)

تُنشئ مؤسسة التهابات المفاصل شبكة دعم من خلال التجارب المشاركة، وتقوية المعلومات والاتصالات الهادفة. سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو بشكل شخصي، إننا نعمل كلنا معًا لتعزيز الموارد والأبحاث، ولخلق اتصالات مجتمعية.

توجه إلى www.arthritis.org أو اتصل على 1-800-283-7800.

شبكة البث الخاصة بالتهاب المفاصل (Arthritis Broadcast Network)

حيث تقودها Arthritis Consumer Experts ومركز الأبحاث الكندي لالتهاب المفاصل، فإن شبكة البث الخاصة بالتهاب المفاصل (ABN) هي منصة متعددة الوسائط لمجتمع التهابات المفاصل لمشاركة الأخبار، والمعلومات والقصص حول التهابات المفاصل لديهم.

توجه إلى www.arthritisbroadcastnetwork.org.

صحة المفاصل (Joint Health™)

تُعد Arthritis Consumer Experts (ACE) منظمة وطنية يقودها المرضى تقدم معلومات مجانية قائمة على العلم وبرامج تعليمية بكلتا اللغتين الرسميتين للأشخاص الذين يعانون من التهابات المفاصل.

توجه إلى www.jointhehealth.org أو اتصل على 1-604-974-1366.

لا تتضمن الموارد المقترحة على هذه الصفحة موافقة من منظمات خارجية أو اتحادًا معها وهي متوفرة لأغراض تقديم المعلومات فقط. لا تُعد فايزر (Pfizer) مسؤولة عن محتوى المواقع غير موقع فايزر.



الدعم قد يجدي نفعًا

إذا كنت تعتقد أن مجموعة الدعم قد تكون مفيدة لك، فاسأل فريق الرعاية الصحية الخاص بك عن مجموعات الدعم في منطقتك.

Support Program

PfizerFlex

الدعم المتخصص. أصبح شخصيًا.

يُعد برنامج PfizerFlex للدعم خدمة شخصية تهدف إلى تقديم الدعم الطبي، والمالي والعاطفي طوال رحلتك. يقدم برنامج الدعم هذا معلومات ونصائح بالإضافة إلى موارد إضافية يمكنها مساعدتك أثناء علاجك. تشمل الخدمات التي يقدمها برنامج الدعم هذا على:

- الدعم عن طريق مركز الاتصال مع إتاحة ساعات عمل مناسبة يمكنك فيها الوصول إلى مدرب الرعاية الخاص بك في PfizerFlex (PfizerFlex Care Coach) لتلقي المساعدة وطرح الأسئلة حول التسجيل، والوصول إلى الدواء وخطتك العلاجية
- المساعدة في استكشاف خيارات للمساعدة المالية
- معلومات ونصائح خاصة بنمط الحياة لمساعدتك على التعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي لديك في المنزل ومكان العمل
- أدوات مفيدة لمساعدتك على الالتزام بخطتك العلاجية وعيش نمط حياة صحي

للمزيد من المعلومات أو للتسجيل، اتصل على 1-855-935-3539 أو توجه إلى www.pfizerflex.ca.

للمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى mypfizer.ca



© RUXIENCE هي علامة تجارية تابعة لشركة Pfizer Inc. وتستخدم بموجب ترخيص.

© RITUXAN هي علامة تجارية مسجلة لشركة Genentech, Inc.

© TYLENOL هي علامة تجارية مسجلة تابعة لشركة Johnson & Johnson.

© BENADRYL هي علامة تجارية مسجلة تابعة لشركة Johnson & Johnson.

© 2022 Pfizer Canada ULC, Kirkland, Quebec H9J 2M5

PP-RIT-CAN-0073-AR