

NOUS  
VOUS PRÉSENTONS

Pr **TRAZIMERA**<sup>MD</sup>  
(trastuzumab)



 Pr **Trazimera**<sup>MD</sup>  
trastuzumab

 **Pfizer**

## Première étape de mon traitement par TRAZIMERA

Entreprendre un nouveau traitement peut constituer un défi – c'est pourquoi il est important pour vous de chercher du soutien. La présente brochure sur TRAZIMERA a été expressément conçue dans cet esprit : vous soutenir et vous informer au sujet du médicament qui vous a été prescrit.

Lisez attentivement cette brochure pour vous familiariser avec l'essentiel de TRAZIMERA, et souvenez-vous de la garder à portée de main, car elle pourra vous aider à mieux comprendre votre traitement et la façon de faire face à votre maladie. Aussi, soyez honnête envers vous-même et votre équipe de soins de santé au sujet de votre état et partagez avec ces professionnels de la santé toutes les questions et préoccupations que vous pourriez avoir à propos de votre plan de traitement.

## Pourquoi utilise-t-on TRAZIMERA?

- TRAZIMERA est utilisé chez certains patients atteints d'un cancer de l'estomac qui s'est propagé à d'autres organes ou à d'autres parties du corps pour ralentir la croissance de certaines cellules du cancer de l'estomac qui produisent des quantités importantes de protéine HER2.
- TRAZIMERA est utilisé en association avec une chimiothérapie (capécitabine ou 5-fluorouracile par voie intraveineuse, et en association avec le cisplatine) pour le traitement du cancer de l'estomac qui s'est propagé à d'autres organes ou à d'autres parties du corps.



## Dans quelles circonstances faut-il utiliser TRAZIMERA?

- Les patients dont les cellules tumorales du cancer de l'estomac produisent de grandes quantités de protéine HER2 peuvent prendre TRAZIMERA.
- TRAZIMERA est utilisé en association avec une chimiothérapie (capécitabine ou 5-fluorouracile par voie intraveineuse, et en association avec le cisplatine) pour le traitement du cancer de l'estomac qui s'est propagé à d'autres organes ou à d'autres parties du corps chez les patients n'ayant pas déjà reçu un traitement anticancéreux pour cette maladie.

## Comment TRAZIMERA agit-il?

TRAZIMERA appartient à une classe de médicaments appelés « anticorps monoclonaux ». Les anticorps monoclonaux ont la capacité de se fixer aux protéines situées à la surface des cellules cancéreuses.

Une fois qu'il s'est fixé au récepteur HER2 sur une cellule cancéreuse, TRAZIMERA arrête la croissance de cette cellule et peut même la détruire.

## Sous quelle forme pharmaceutique TRAZIMERA est-il offert?

TRAZIMERA est offert sous forme de poudre stérile à reconstituer avec un diluant.

- Fiole de 150 mg de TRAZIMERA
- Fiole de 440 mg de TRAZIMERA

Le bouchon de la fiole n'est pas fabriqué avec du caoutchouc naturel (latex).


## De quelle façon TRAZIMERA me sera-t-il administré?

TRAZIMERA est administré par perfusion intraveineuse (i.v.), c'est-à-dire par une aiguille insérée dans une veine du bras ou de la main.

## À quelle fréquence recevrai-je TRAZIMERA?

Votre infirmière autorisée vous administrera TRAZIMERA à des intervalles réguliers déterminés par votre médecin (en général, toutes les 3 semaines).

La première perfusion de TRAZIMERA dure environ 90 minutes. Si vous la tolérez bien, les perfusions suivantes pourront être administrées plus rapidement, habituellement en 30 minutes environ.



**La durée des perfusions et de l'ensemble de votre traitement par TRAZIMERA dépendra de votre réponse au médicament. Votre médecin évaluera régulièrement votre réponse pour déterminer combien de doses vous recevrez.**

## Renseignements importants sur l'innocuité

### Que devrais-je savoir avant de commencer à recevoir TRAZIMERA?

Vous ne devez pas recevoir TRAZIMERA si vous êtes allergique au trastuzumab, aux protéines des cellules ovariennes de hamsters chinois ou à tout autre ingrédient du produit.

### Pour aider à éviter les effets secondaires et assurer une utilisation appropriée du médicament, discutez avec votre professionnel de la santé avant de recevoir TRAZIMERA

Informez votre professionnel de la santé de toutes vos maladies et de tous vos problèmes de santé, notamment si vous :

- avez déjà mal réagi à TRAZIMERA, à l'alcool benzylique ou à l'un des ingrédients inactifs;
- êtes allergique à d'autres médicaments, à des aliments ou à des colorants;
- prenez d'autres médicaments, qu'ils aient été prescrits par votre médecin ou non;
- êtes atteint d'une autre maladie, comme un problème cardiaque, une maladie cardiaque, un problème respiratoire ou une maladie pulmonaire;
- êtes enceinte, prévoyez le devenir ou allaitez; veuillez noter qu'une réduction de la quantité de liquide amniotique a été observée chez les femmes enceintes qui recevaient du trastuzumab;
- avez de la difficulté à respirer quand vous êtes au repos.

# Renseignements importants sur l'innocuité

## Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à TRAZIMERA?

Lorsque vous recevez TRAZIMERA, vous pourriez ressentir des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-après. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Tout médicament peut causer des effets indésirables. Si des effets secondaires vous inquiètent ou vous dérangent beaucoup, parlez-en à votre médecin, à votre infirmière ou à votre pharmacien, et signalez sans tarder à votre médecin tout symptôme nouveau ou persistant. Votre médecin pourra vous dire quoi faire et pourrait vous aider à atténuer vos symptômes.

Certains effets indésirables apparaissent durant la première perfusion ou peu après. Ces effets sont habituellement de courte durée, mais ils peuvent nécessiter un traitement. Il est possible que la perfusion soit interrompue et reprise, ou qu'elle soit administrée pendant une période de temps plus longue.

### Les effets indésirables liés à la perfusion peuvent comprendre les effets suivants :

- démangeaisons;
- étourdissements;
- respiration sifflante;
- battements de cœur rapides.

La prise de certains médicaments avant la perfusion suivante de TRAZIMERA pourrait prévenir ces effets indésirables.


Les effets indésirables le plus souvent observés pendant la principale étude clinique sur le cancer de l'estomac, qu'on sait associés aux agents de chimiothérapie utilisés pendant l'étude et à l'administration du trastuzumab, ont été :

- les troubles gastro-intestinaux, comme les nausées, les vomissements, la diarrhée et la constipation;
- les troubles sanguins, comme la neutropénie (diminution du nombre de globules blancs), l'anémie (diminution du nombre de globules rouges) et la thrombopénie (diminution du nombre de plaquettes [cellules sanguines incolores jouant un rôle important dans la coagulation sanguine]).

Appelez votre médecin immédiatement si vous remarquez l'un ou l'autre des symptômes suivants :

- essoufflement;
- aggravation de la toux;
- enflure des jambes à cause d'une rétention d'eau;
- diarrhée – plus de quatre selles par jour ou de la diarrhée pendant la nuit;
- symptômes d'une infection, entre autres :
  - fièvre (une température de 38 °C ou plus);
  - rougeur ou enflure;
  - mal de gorge;
  - douleur quand vous urinez;
  - toux;
- symptômes d'une réaction allergique, entre autres :
  - resserrement de la gorge;
  - éruption cutanée;
  - enflure des lèvres et de la langue;
  - étourdissements;
  - urticaire;
  - battements de cœur rapides.

Pour en savoir plus sur les effets secondaires possibles de TRAZIMERA, veuillez consulter la notice d'emballage que votre équipe soignante vous a remise.



# Renseignements importants sur l'innocuité

## Mises en garde et précautions importantes



### ERREURS DE MÉDICAMENT

Il existe un risque d'erreur de médication entre TRAZIMERA (trastuzumab) et Kadcyła® (trastuzumab emtansine). Vérifiez auprès du fournisseur de soins de santé que c'est bien la dose recommandée de TRAZIMERA (trastuzumab) qui est administrée et NON celle de Kadcyła (trastuzumab emtansine).



### CARDIOTOXICITÉ (EFFETS TOXIQUES SUR LE CŒUR)

L'administration de TRAZIMERA peut entraîner des problèmes cardiaques, notamment une insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque peut apparaître plus tard, après la fin du traitement par TRAZIMERA. Dans le traitement du cancer du sein au stade précoce, l'incidence de dysfonction cardiaque était plus élevée chez les patientes traitées par le trastuzumab en association avec une chimiothérapie que chez celles qui avaient reçu uniquement la chimiothérapie, et ce risque était plus élevé lorsque le trastuzumab était administré avec un taxane après un traitement par une anthracycline et le cyclophosphamide. Chez les patientes atteintes d'un cancer du sein qui s'était propagé à d'autres organes ou à d'autres parties du corps, l'incidence et la gravité de la dysfonction cardiaque ont été particulièrement marquées chez les femmes qui avaient reçu le trastuzumab en même temps que des anthracyclines et du cyclophosphamide.

**Votre fonction cardiaque doit être évaluée par votre médecin avant et pendant votre traitement par TRAZIMERA.**



### RÉACTIONS LIÉES À LA PERFUSION; PROBLÈMES PULMONAIRES

Certains patients ont présenté des réactions liées à la perfusion et des problèmes pulmonaires graves. Des cas de réactions mortelles à la perfusion ont été signalés. Dans la plupart des cas, ces réactions se sont produites pendant la perfusion de trastuzumab ou dans les 24 heures qui ont suivi. Votre perfusion de TRAZIMERA doit être arrêtée temporairement si vous êtes essoufflé ou si votre tension artérielle est très basse. Votre médecin vous surveillera jusqu'à ce que ces symptômes aient disparu. Si vous avez une réaction allergique sévère, de l'enflure, des problèmes pulmonaires, une inflammation des poumons ou un essoufflement sévère, votre médecin pourrait devoir arrêter définitivement votre traitement par TRAZIMERA.



### TOXICITÉ POUR LE FŒTUS (BÉBÉ À NAÎTRE)

**Lorsqu'il est pris par une femme enceinte, TRAZIMERA peut être nocif pour le fœtus (bébé à naître) et, dans certains cas, provoquer la mort du fœtus.** Les femmes en âge de procréer doivent utiliser des méthodes de contraception efficaces durant le traitement par TRAZIMERA et pendant au moins 7 mois après la fin du traitement. Les femmes traitées par TRAZIMERA qui allaitent doivent arrêter d'allaiter ou de prendre TRAZIMERA.

# Préparation pour mon prochain rendez-vous

Il est important de poser des questions et de partager avec votre équipe soignante toutes vos préoccupations concernant votre traitement. Utilisez l'espace ci-dessous pour noter tout sujet que vous voudriez aborder avec votre équipe soignante lors d'une de vos prochaines visites.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

## Coordonnées des membres de mon équipe soignante

Nom : \_\_\_\_\_ Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_



## Le soutien, ça peut aider

Les groupes de soutien peuvent vous aider tout au long de votre expérience de traitement. Si vous souhaitez vous joindre à l'un de ces groupes, vérifiez auprès de votre équipe soignante s'il y en a un dans votre région.

### Ressources additionnelles

#### **Société canadienne du cancer**

La Société canadienne du cancer (SCC) est un organisme national, à caractère communautaire, qui fournit de l'information et des services de soutien aux patients atteints de cancer et à leur famille.

La communauté en ligne de la SCC – ParlonsCancer.ca – est un espace où les patients atteints de cancer et leur famille peuvent partager leurs expériences et créer un réseau de soutien. Où que vous soyez, vous pouvez être en lien avec d'autres personnes et savoir que vous n'êtes pas seul.

Visitez le site [parlonscancer.ca](http://parlonscancer.ca) ou [cancer.ca/fr-ca](http://cancer.ca/fr-ca), ou téléphonez au 1-888-939-3333.

#### **My Gut Feeling**

My Gut Feeling est un réseau de soutien pour les patients atteints d'un cancer de l'estomac (aussi appelé cancer gastrique) et leurs aidants.

Visitez le site [mygutfeeling.ca](http://mygutfeeling.ca) (en anglais), ou téléphonez au 1-647-478-5414.

Les ressources suggérées dans cette page sont fournies à titre d'information seulement; cela ne signifie d'aucune façon que Pfizer approuve ces organismes tiers ni qu'elle y est associée. Pfizer n'est pas responsable du contenu des autres sites.



# Pfizer Liaison

Programme de soutien aux patients

Pour faciliter l'accès aux ressources qui vous soutiendront dans votre traitement et compléteront les soins fournis par votre équipe de soins de santé

- Évaluation et gestion du remboursement
- Coordination des indemnités d'assurances
- Aide financière\*
- Information sur le traitement

Pour vous inscrire au programme Pfizer Liaison, communiquez avec nous par téléphone, au 1-844-616-6888; par télécopieur, au 1-844-636-6888; ou par courriel, à l'adresse [pfizerliaison@bayshore.ca](mailto:pfizerliaison@bayshore.ca).



Pour plus de renseignements, veuillez consulter le [mypfizer.ca](http://mypfizer.ca).

Programme géré par Soins de santé Bayshore ltée.

\* L'aide financière ne peut pas être garantie.



TRAZIMERA<sup>MD</sup> est une marque déposée de Pfizer Inc., utilisée sous licence.  
Kadcyla<sup>®</sup> est une marque déposée de F. Hoffmann-La Roche Limitée SA, utilisée sous licence.  
© 2022 Pfizer Canada SRL. Tous droits réservés.

