

NOUS VOUS  
PRÉSENTONS

# NYVEPRIA<sup>MC</sup>

(pegfilgrastim)



# Première étape de mon traitement par NYVEPRIA

Entreprendre un nouveau traitement peut constituer un défi. La présente brochure a été conçue pour répondre à vos questions et vous aider à tirer le maximum de votre traitement.

Lisez attentivement cette brochure pour vous familiariser avec l'essentiel de NYVEPRIA, et souvenez-vous de la garder à portée de la main, car elle pourra vous aider à mieux comprendre votre traitement. Aussi, il est important d'être honnête envers votre équipe soignante au sujet de votre état pendant le traitement. Partagez avec ces professionnels de la santé les questions et préoccupations que vous pourriez avoir à propos de votre plan de traitement.

## Pourquoi utilise-t-on NYVEPRIA?



NYVEPRIA est utilisé dans le traitement de la neutropénie. Cette affection, qui empêche l'organisme de produire des quantités suffisantes de globules blancs, peut être causée par les médicaments anticancéreux. La neutropénie est le plus grave des effets secondaires courants de la chimiothérapie. Elle prédispose l'organisme aux infections et l'empêche de les combattre. Votre médecin a décidé de vous prescrire NYVEPRIA pour augmenter le nombre de neutrophiles qui combattent les infections.

# Comment NYVEPRIA agit-il?

NYVEPRIA n'est pas un médicament de chimiothérapie, mais on peut parfois l'utiliser avec une chimiothérapie. NYVEPRIA exerce son action en stimulant la production de globules blancs par la moelle osseuse. Pour s'assurer que NYVEPRIA exerce bien son action, il se peut que votre médecin vous demande de subir régulièrement des prises de sang afin de déterminer le nombre de vos globules blancs. Il est important de suivre les instructions du médecin au sujet de ces examens.

## Sous quelles formes NYVEPRIA se présente-t-il?



- Seringue préremplie munie du dispositif de protection passive de l'aiguille BD UltraSafe Plus<sup>MC</sup>, contenant une solution de pegfilgrastim à 6 mg/0,6 mL (10 mg/mL).
- L'embout du piston et le capuchon de l'aiguille de NYVEPRIA ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel\*.
- La seringue préremplie NYVEPRIA est emballée dans une boîte à double épaisseur pour protéger le médicament.

\* La portée clinique est inconnue.

# De quelle façon NYVEPRIA est-il administré?



La dose de NYVEPRIA recommandée consiste en une seule injection sous-cutanée, juste sous la peau, de 6 mg/0,6 mL (soit le contenu d'une seringue préremplie), 1 fois par cycle de chimiothérapie.



Vous devez attendre au moins 24 heures après votre cycle de chimiothérapie anticancéreuse avant d'injecter NYVEPRIA.

## Mesures à prendre en cas de dose oubliée



Comme il faut prévoir une période de 2 semaines entre l'administration de NYVEPRIA et le prochain cycle de chimiothérapie anticancéreuse, consultez votre médecin avant de prendre la dose oubliée.

## Comment faire pour injecter NYVEPRIA?



Votre médecin décidera si vous êtes capable de vous faire vous-même des injections sous-cutanées (c'est-à-dire sous la peau). NYVEPRIA ne doit être injecté que le jour choisi par le médecin. Il ne doit pas être injecté dans les 24 heures qui suivent la dernière dose de chaque cycle de chimiothérapie.



Si vous administrez une injection de NYVEPRIA à quelqu'un d'autre, il est important que vous appreniez comment et quand procéder à cette injection.

**Pour savoir comment préparer et administrer une injection de NYVEPRIA, consultez les directives d'utilisation aux pages 10 à 13.**

# Renseignements importants sur l'innocuité

## Que devrais-je savoir avant de commencer à recevoir NYVEPRIA?

N'utilisez pas NYVEPRIA si vous êtes allergique au pegfilgrastim, au filgrastim, à tout ingrédient de NYVEPRIA ou à tout autre produit fabriqué à l'aide de la bactérie *Escherichia coli*. Si vous avez des questions à ce sujet, adressez-vous à votre médecin.

Avant de prendre NYVEPRIA, informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes de santé, y compris si :

- vous constatez la présence persistante d'une bosse, d'une contusion (un « bleu ») ou d'enflure au point d'injection, parlez-en à votre médecin. Il arrive occasionnellement qu'un problème survienne au point d'injection;
- vous êtes porteur du trait drépanocytaire ou que vous avez la drépanocytose, signalez-le à votre médecin avant de commencer le traitement. Si vous ressentez une douleur dans la partie supérieure gauche de l'abdomen ou au sommet de l'épaule gauche au cours du traitement, prévenez immédiatement votre médecin ou votre infirmière;
- vous êtes enceinte, avez l'intention de le devenir ou pensez l'être, ou encore si vous allaitez, consultez un médecin avant d'utiliser NYVEPRIA.

Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments/drogues, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce.



# Renseignements importants sur l'innocuité

## Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à NYVEPRIA ?



L'effet secondaire le plus courant que vous pourriez ressentir est une douleur dans les os et les muscles. La prise d'un analgésique en vente libre ne contenant pas d'acide acétylsalicylique permet généralement de soulager cette douleur. Demandez à votre médecin de vous indiquer celui qui vous conviendrait le mieux.

NYVEPRIA peut causer les effets secondaires suivants :



### **RUPTURE DE LA RATE**

Il est possible que votre rate grossisse et se déchire (rupture de la rate) pendant que vous prenez NYVEPRIA. Une rupture de la rate peut entraîner la mort. La rate est située dans la partie supérieure gauche de l'abdomen. Appelez immédiatement votre médecin si vous avez des douleurs dans la partie supérieure gauche de l'abdomen ou au sommet de l'épaule gauche. Ces douleurs pourraient signifier que votre rate est plus grosse que la normale ou qu'il y a eu rupture.



### **DES RÉACTIONS ALLERGIQUES GRAVES** peuvent également se produire.

Ces réactions peuvent provoquer une éruption cutanée sur tout le corps, un essoufflement, une respiration sifflante, une chute de la tension artérielle (causant habituellement des étourdissements ou une sensation de tête légère), une enflure autour de la bouche ou des yeux, un pouls rapide ou de la transpiration. Si vous avez une réaction allergique pendant l'injection de NYVEPRIA, il faut cesser l'injection immédiatement. **En tout temps, si une réaction allergique grave survient, appelez immédiatement un médecin ou les services d'urgence (p. ex., composez le 911).**



### **FAIBLE NOMBRE DE PLAQUETTES (THROMBOCYTOPÉNIE),**

qui se présente comme une prédisposition aux ecchymoses (« bleus ») et aux saignements accrus.



### **PROBLÈME PULMONAIRE GRAVE APPELÉ « SYNDROME DE DÉTRESSE RESPIRATOIRE AIGÜË » (SDRA).**

Appelez votre médecin ou allez immédiatement à l'urgence si vous ressentez un essoufflement, avez de la difficulté à respirer ou avez une respiration rapide.



**DES CAS DE LÉSION RÉNALE (GLOMÉRULONÉPHRITE)** ont été signalés chez des patients qui avaient pris NYVEPRIA. Téléphonez immédiatement à votre médecin en cas de boursouffle du visage ou d'enflure des chevilles, de sang dans l'urine ou d'urine de couleur brune, ou encore si vous urinez moins souvent que d'habitude.



**VASCULARITE CUTANÉE,**

c'est-à-dire une éruption à la surface de la peau qui ressemble à des taches ou à des petites bosses de couleur pourpre ou rouge, à des grappes de petits points, à des taches ou à de l'urticaire. Cette éruption cutanée peut également être accompagnée de démangeaisons. Si vous éprouvez n'importe lequel de ces effets secondaires, parlez-en à votre professionnel de la santé.



**SYNDROME DE FUITE CAPILLAIRE**

qui peut se présenter sous la forme d'une enflure ou d'une boursouffle pouvant être associées à une fréquence urinaire réduite, à une difficulté à respirer, à un gonflement de l'abdomen, à une sensation d'estomac plein et à une fatigue générale. Si vous éprouvez n'importe lequel de ces effets secondaires, parlez-en à votre professionnel de la santé.



**DES CRISES SÉVÈRES DE DRÉPANOCYTOSE** ont été associées à

l'administration de pegfilgrastim à des patients porteurs du trait drépanocytaire ou atteints de drépanocytose. L'administration du filgrastim, molécule mère du pegfilgrastim, a aussi été associée à des poussées sévères de drépanocytose, parfois menant au décès du patient. Si vous êtes porteur du trait drépanocytaire ou que vous avez la drépanocytose, vous devez en informer votre médecin avant de commencer à prendre NYVEPRIA afin qu'il puisse discuter avec vous des risques et des bienfaits potentiels du traitement.



**NOMBRE ANORMAL DE CELLULES IMMATURES DANS LA MOELLE OSSEUSE (SYNDROME MYÉLODYSPLASIQUE)**

pouvant mener à un type de cancer (leucémie myéloïde aiguë), qui se présente sous les symptômes suivants : fièvre, douleur osseuse, ecchymoses [« bleus »], difficultés à respirer, saignements et sensation générale de fatigue\*.



**UNE ROUGEUR, UNE ENFLURE OU UNE DÉMANGEAISON**

au point d'injection. Il peut s'agir d'une allergie aux ingrédients de NYVEPRIA ou d'une réaction locale. Si vous remarquez un de ces signes ou symptômes, communiquez avec votre médecin.

Lorsque vous prenez NYVEPRIA, vous pourriez ressentir des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ici. Si c'est le cas, appelez votre professionnel de la santé.

\* Effets indésirables notés chez des patients atteints de cancer du sein ou de cancer du poumon traités par chimiothérapie et/ou radiothérapie.

# Comment puis-je réduire mon risque d'infection?

La neutropénie augmente le risque d'attraper des infections. Alors, pendant que vous prenez NYVEPRIA, prenez les mesures suivantes pour essayer d'éviter les infections :

## 1. Ayez une bonne hygiène personnelle



- **Lavez-vous souvent les mains**, en particulier avant de manger ou après être allé aux toilettes.
- Ayez toujours une petite bouteille de **gel désinfectant pour les mains** sur vous pour vous désinfecter les mains.
- **Prenez une douche tiède** (pas chaude) tous les jours (pour éviter de dessécher votre peau).
- **Utilisez une brosse à dents à poils souples** pour vous brosser les dents afin d'éviter de vous irriter les gencives.

## 2. Protégez votre peau



- **Utilisez un lait corporel** si votre peau se dessèche ou se fissure.
- **Portez des gants en caoutchouc** lorsque vous faites la vaisselle ou le ménage ou lorsque vous jardinez.
- **Évitez de pincer ou de gratter vos boutons.**
- **Utilisez un rasoir électrique** plutôt qu'un rasoir ordinaire pour réduire le risque de coupures.
- **Faites attention pour éviter les brûlures** lorsque vous repassez ou cuisinez.
- **Nettoyez toute coupure ou éraflure immédiatement** avec de l'eau tiède et du savon.

## 3. Essayez de conserver un bon état de santé général



- **Reposez-vous suffisamment.**
- **Adoptez une alimentation équilibrée.**
- **Buvez suffisamment.**
- **Faites de l'exercice** aussi souvent que possible.
- **Évitez d'être en contact avec des personnes qui ont le rhume**, la grippe ou toute autre maladie infectieuse.
- **Évitez les foules**, par exemple dans les centres commerciaux ou dans les autobus.
- **Évitez de consommer des œufs non cuits, de la viande rouge, de la volaille, du poisson ou des fruits de mer crus ou n'ayant pas été assez cuits.**
- **Éliminez les plantes de votre habitation** – les plantes vivantes peuvent être une source de germes.
- **Évitez de nettoyer vous-même la litière du chat** ou la cage de l'oiseau.

# Directives d'utilisation


## Utilisation de la seringue préremplie NYVEPRIA

### 1) Retirez la boîte contenant la seringue préremplie du réfrigérateur

- Sortez l'emballage de la seringue de la boîte. Placez l'emballage de la seringue sur un plan de travail propre et bien éclairé à la température ambiante pendant **30 minutes** avant de faire une injection.
  - ✗ o **N'utilisez pas** la seringue préremplie si son emballage a été endommagé.
  - ✗ o **N'essayez pas** de réchauffer la seringue préremplie à l'aide d'une source de chaleur comme de l'eau chaude ou un four à micro-ondes.
  - ✗ o **N'exposez pas** directement à la lumière du soleil.
  - ✗ o **N'agitez pas** la seringue préremplie.

### 2) Rassemblez tout le matériel d'injection nécessaire et examinez le médicament et la seringue préremplie

- Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon.
- Placez les fournitures suivantes sur un plan de travail propre et bien éclairé :
  - o Tampon imbibé d'alcool
  - o Tampon d'ouate ou de gaze
  - o Pansement adhésif
  - o Contenant pour la mise au rebut des objets pointus et tranchants
  - o Seringue préremplie
    - Sortez la seringue préremplie de son emballage en la saisissant par le dispositif de protection de l'aiguille.
    - Pour des raisons de sécurité :
      - ✗ • **Ne saisissez pas** la seringue préremplie par la tige du piston.
      - ✗ • **Ne saisissez pas** la seringue préremplie par le capuchon de l'aiguille.




- Assurez-vous que le médicament contenu dans la seringue préremplie est limpide et incolore.

- ❌ • **N'utilisez pas** la seringue préremplie NYVEPRIA si :
  - o le médicament est trouble ou a changé de couleur, ou contient des flocons ou des particules;
  - o n'importe quelle partie de la seringue préremplie semble fissurée ou brisée;
  - o la seringue préremplie a été échappée;
  - o le capuchon de l'aiguille est manquant ou mal fixé;
  - o la date de péremption figurant sur l'étiquette est passée.

### 3) Préparez-vous

- Choisissez un point d'injection



- Nettoyez le point d'injection avec un tampon imbibé d'alcool. Laissez sécher la peau.

- ❌ • **Ne retouchez plus** la zone nettoyée avant l'injection.

- Si vous souhaitez faire l'injection dans une région du corps où le médicament a été injecté précédemment, assurez-vous de ne pas choisir le même point d'injection.



- ❌ • **N'injectez pas** le médicament là où la peau est sensible, rouge, dure ou couverte d'un bleu. Évitez d'effectuer les injections dans les régions présentant des cicatrices ou des vergetures.

Tenez la seringue préremplie par le dispositif de protection de l'aiguille. Enlevez prudemment le capuchon de l'aiguille en tirant bien droit dans une direction opposée à celle de votre corps. Jetez le capuchon de l'aiguille dans le contenant pour la mise au rebut des objets pointus et tranchants. **Ne remettez pas le capuchon sur l'aiguille.**

- ❌ • **Ne retirez pas** le capuchon de l'aiguille de la seringue préremplie avant d'être prêt à effectuer l'injection.
- ❌ • **Évitez** de tordre ou de plier le capuchon de l'aiguille.
- ❌ • **Ne tenez pas** la seringue préremplie par la tige du piston.
- ❌ • **Ne remettez pas** le capuchon sur l'aiguille de la seringue préremplie.

# Directives d'utilisation


## 4) Injection de votre dose de NYVEPRIA

- Pincez la peau au point d'injection pour créer une surface ferme.



**Important :** Continuez de pincer la peau durant l'injection.

- Introduisez l'aiguille dans la peau pincée à un angle de 45 à 90 degrés.




- En exerçant une pression constante, enfoncez lentement et à fond la tige du piston.



- Une fois la seringue vide, retirez délicatement l'aiguille du point d'injection.



- Au moment où vous lâchez la tige du piston, le dispositif de protection de l'aiguille glissera par-dessus l'aiguille sur toute sa longueur et se verrouillera automatiquement. **Ne remettez pas le capuchon sur l'aiguille.**



**Important :** À la fin de l'injection, s'il semble rester du médicament dans le corps de la seringue, c'est que vous n'avez pas reçu une dose complète. Téléphonnez immédiatement à votre fournisseur de soins de santé.

## 5) Examinez le point d'injection et jetez la seringue

- S'il y a du sang, placez un tampon d'ouate ou de gaze sur le point d'injection, puis appuyez dessus. **Ne frottez pas** le point d'injection. Appliquez un pansement adhésif, au besoin.
- Jetez la seringue conformément aux directives de votre fournisseur de soins de santé ou aux instructions figurant ci-dessous. Certaines lois provinciales ou locales peuvent encadrer l'élimination des aiguilles et des seringues usagées.
  - o Jetez la seringue préremplie usagée dans un contenant pour la mise au rebut des objets pointus et tranchants tout de suite après l'injection du médicament. **Ne jetez pas** les seringues avec les ordures ménagères.
  - o Gardez toujours le contenant pour la mise au rebut des objets pointus et tranchants hors de la portée des enfants.

Lisez les instructions détaillées sur la façon de préparer et d'injecter une dose de NYVEPRIA dans le feuillet de renseignements destinés aux patients.

# Préparation de mon prochain rendez-vous

Il est important de poser des questions et de faire part à votre équipe soignante de toutes vos préoccupations concernant votre traitement. Utilisez l'espace ci-dessous pour noter tout sujet que vous voudriez aborder avec votre équipe soignante lors d'une de vos prochaines visites.


1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_

## Coordonnées des membres de mon équipe soignante

Nom : \_\_\_\_\_ Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_

## Ma fiche de suivi des injections

L'image ci-dessous montre les régions du corps qui sont des points d'injection appropriés. De plus, pour éviter de choisir le même point d'injection que pour l'injection précédente, le tableau de la page suivante vous sera utile pour vous rappeler le dernier point d'injection. N'oubliez pas que vous devez attendre au moins 24 heures après votre cycle de chimiothérapie anticancéreuse avant d'injecter NYVEPRIA. Ainsi, si vous avez reçu un cycle de chimiothérapie au cours de la journée, vous pourrez prévoir une injection de NYVEPRIA le lendemain dans la soirée.







# Apprenez à reconnaître et à signaler les infections

NYVEPRIA peut réduire le risque d'infection, mais il ne prévient pas toutes les infections. Une infection peut survenir pendant la courte période où votre nombre de globules blancs est faible. N'oubliez pas de signaler à votre médecin ou à votre équipe soignante tout symptôme d'infection.

Une infection se manifeste notamment par les signes et symptômes suivants :

- Fièvre, frissons
- Éruption cutanée, enflure ou rougeur
- Maux de gorge
- Diarrhée
- Écoulement, pus, rougeur, enflure ou douleur au site d'une coupure, d'une plaie ou d'une incision

Ne prenez pas de médicament contre la fièvre sans d'abord en parler à votre équipe soignante.

## Ressources en ligne utiles

[www.cancer.ca](http://www.cancer.ca) (Société canadienne du cancer)  
[www.cancer.org](http://www.cancer.org) (American Cancer Society; en anglais seulement)  
[www.standuptocancer.ca/fr/](http://www.standuptocancer.ca/fr/)

## La carte de paiement virtuelle de la quote-part des G-CSF de Pfizer est maintenant offerte à vos patients traités par NYVEPRIA par l'intermédiaire de SécurIndemnité!

Veillez présenter la carte de paiement de la quote-part à la pharmacie de votre choix. Cette carte peut couvrir **jusqu'à 30 % du coût de NYVEPRIA.**

Pour les pharmaciens traitant le paiement par l'intermédiaire de SécurIndemnité, veuillez utiliser les renseignements suivants :

- Tiers payeur : SécurIndemnité
- Numéro de groupe pour les G-CSF de Pfizer : 37327
- Numéro de certificat : pour les résidents du Québec : 00002001NV  
pour les résidents canadiens hors Québec : 00001001NV
- Coordination : dernier payeur
- Code désignant le lien avec l'assuré : TITULAIRE DE LA CARTE (CARDHOLDER)

N'hésitez pas à téléphoner au centre d'assistance à l'intention des pharmacies de SécurIndemnité, au 1-800-461-6579, pour toute question ou pour obtenir davantage de renseignements.






# Pfizer Liaison

Programme de soutien aux patients

Vous faciliter l'accès à des ressources qui vous soutiendront dans votre traitement et compléteront les soins fournis par votre équipe soignante

- Évaluation et gestion du remboursement
- Coordination des indemnités d'assurances
- Aide financière\*
- Information sur le traitement

Pour vous inscrire au programme Pfizer Liaison, communiquez avec nous par téléphone, au 1-844-616-6888 (sans frais); par télécopieur, au 1-844-636-6888; ou par courriel, à l'adresse [pfizerliaison@bayshore.ca](mailto:pfizerliaison@bayshore.ca).



Pour plus de renseignements au sujet de NYVEPRIA ou pour accéder à d'autres ressources utiles, veuillez consulter le [mypfizer.ca/fr](http://mypfizer.ca/fr)

\* L'aide financière ne peut pas être garantie.



---

#### MODALITÉS D'UTILISATION DE LA CARTE DE PAIEMENT VIRTUELLE DE LA QUOTE-PART

Veillez conserver la carte des G-CSF, car vous pourrez vous en servir aussi longtemps que votre médecin vous prescrira votre médicament ou jusqu'à ce que le programme prenne fin. Le fabricant peut modifier les montants de l'aide financière à sa discrétion. Les données personnelles recueillies ne seront pas transmises au fabricant pharmaceutique ni à tout autre tiers.

BD UltraSafe Plus<sup>MC</sup> est une marque de commerce de Safety Syringes, Inc. dont la société mère est Becton, Dickinson and Company.  
NYVEPRIA<sup>MC</sup> est une marque de commerce d'Hospira Inc., utilisée sous licence.  
© 2023 Pfizer Canada SRI. Tous droits réservés.

PP-NYV-CAN-0008-FR

