

ਤੁਹਾਡੀ

Pr **TRAZIMERA**®

ਪਰਤੀ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ

(trastuzumab)



 Pr **Trazimera**®
trastuzumab

 **Pfizer**

ਮੇਰੇ TRAZIMERA ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ

ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ TRAZIMERA ਪਰਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ TRAZIMERA ਬਾਰੇ ਮੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣ।

TRAZIMERA ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

- TRAZIMERA ਗੈਸਟਰਿਕ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਸਟਰਿਕ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ HER2 ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ਗੈਸਟਰਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ TRAZIMERA ਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ (ਕੇਪਸੀਟੇਬਾਈਨ ਜਾਂ ਨਾੜੀ 5-ਫਲੂਰੋਊਰੇਸਿਲ ਅਤੇ ਕਿਸਪਲੈਟਿਨ (capecitabine or intravenous 5-fluorouracil and cisplatin)) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ



TRAZIMERA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

- ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟਰਿਕ ਕੈਂਸਰ ਟਿਊਮਰ ਸੈੱਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ HER2 ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ TRAZIMERA ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਗੈਸਟਰਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ TRAZIMERA ਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ (ਕੇਪਸੀਟੇਬਾਈਨ ਜਾਂ ਨਾੜੀ 5-ਫਲੂਰੋਊਰੇਸਿਲ ਅਤੇ ਕਿਸਪਲੈਟਿਨ (capecitabine or intravenous 5-fluorouracil and cisplatin)) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ-ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ

TRAZIMERA ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

TRAZIMERA ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

TRAZIMERA ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਉੱਤੇ HER2 ਰਿਸੈਪਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

TRAZIMERA ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

TRAZIMERA ਸਟੇਰਾਈਲ ਪਾਊਡਰ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- 150 ਮਿਗ੍ਰਾ TRAZIMERA ਦੀ ਬੋਤਲ
- 440 ਮਿਗ੍ਰਾ TRAZIMERA ਦੀ ਬੋਤਲ

ਬੋਤਲ ਦਾ ਸਟੋਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਬੜ ਲੈਟੈਕਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।


TRAZIMERA ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

TRAZIMERA ਨੂੰ ਨਾੜੀ (IV) ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।

TRAZIMERA ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ TRAZIMERA ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੇਗੀ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ 3 ਹਫ਼ਤੇ)।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ TRAZIMERA ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੀਬ 90 ਮਿੰਟ ਲਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾਖਿਲੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਦਾਖਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਮਿੰਟ।



ਤੁਹਾਡੇ TRAZIMERA ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ

TRAZIMERA ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

TRAZIMERA ਨਾ ਵਰਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ trastuzumab, Chinese Hamster Ovary ਸੈੱਲ ਪਰੋਟੀਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ।

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਉਪਯੁਕਤ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TRAZIMERA ਲਓ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਸਮੇਤ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ:

- TRAZIMERA, ਬੈਨਜ਼ਿਲ ਅਲਕੋਹਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਨੁਭਵ ਹੋਈ ਸੀ
- ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਡਾਈ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ
- ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ
- ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
- ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ trastuzumab ਲੈਂਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨੀਓਟਿਕ ਤਰਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਆਰਾਮ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ

TRAZIMERA ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ TRAZIMERA ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਜੋ ਇਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।

ਕੁੱਝ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਟੀਕਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

- ਖਾਰਿਸ਼
- ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ
- ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ
- ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ

TRAZIMERA ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਗੈਸਟਰਿਕ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਕਲੀਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ trastuzumab ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਨ:

- ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਕਬਜ਼
- ਖੂਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਟਰੋਪੇਨੀਆ (neutropenia) (ਚਿੱਟੇ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ), ਅਨੇਮੀਆ (anemia) (ਲਾਲ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ) ਅਤੇ ਥਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ (thrombocytopenia) (ਪਲੇਟਲੈਟ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ [ਬੇਰੰਗ ਸੈੱਲ ਜੋ ਬਲੱਡ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ])।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ:

- ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
- ਵਧੀ ਖੰਘ
- ਪਾਣੀ ਠਹਿਰਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਿਸ਼
- ਦਸਤ—ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰ ਪਖਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
- ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
 - ਬੁਖਾਰ (38°C ਜਾਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ)
 - ਖਰਾਬ ਗਲਾ
 - ਖੰਘ
 - ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਸੋਜਿਸ਼
 - ਦਰਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ
- ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
 - ਗਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
 - ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਸੋਜਿਸ਼
 - ਛਪਾਕੀ
 - ਧੱਫੜ
 - ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ
 - ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ

TRAZIMERA ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੋ।



ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ



ਦਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ

TRAZIMERA (trastuzumab) ਅਤੇ dcyla® (trastuzumab emtansine) ਦਰਮਿਆਨ ਦਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ TRAZIMERA (trastuzumab) ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ Kadcyca (trastuzumab emtansine) ਖੁਰਾਕ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।



Cardiotoxicity (ਦਿਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ)

TRAZIMERA ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਤ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ TRAZIMERA ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਡੀਐਕ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ trastuzumab ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਮੇਥੇਰੇਪੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਬਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀਮੇਥੇਰੇਪੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਿਮ ਸੀ ਜਦੋਂ anthracycline ਅਤੇ cyclophosphamide ਤੋਂ ਬਾਅਦ trastuzumab ਨੂੰ taxane ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਰਡੀਐਕ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ trastuzumab ਨੂੰ anthracyclines ਅਤੇ cyclophosphamide ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। **ਤੁਹਾਨੂੰ TRAZIMERA ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।**



ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ:

ਫੇਫੜੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੁੱਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ trastuzumab ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ TRAZIMERA ਟੀਕਾ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ TRAZIMERA ਇਲਾਜ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਭਰੂਣ (ਗੈਰਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ)

ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ TRAZIMERA ਭਰੂਣ (ਗੈਰਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ TRAZIMERA ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ TRAZIMERA ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗਰਭ ਰੋਧਕ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ TRAZIMERA ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਜਾਂ TRAZIMERA ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ਮੇਰੀ ਸਿਹਤਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਾਮ: _____ ਫੋਨ #: _____

ਨਾਮ: _____ ਫੋਨ #: _____

ਨਾਮ: _____ ਫੋਨ #: _____

ਨਾਮ: _____ ਫੋਨ #: _____

ਨਾਮ: _____ ਫੋਨ #: _____

ਨਾਮ: _____ ਫੋਨ #: _____



ਸਹਿਯੋਗ ਮੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (CCS) ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

CCS ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ —Cancerconnection.ca—ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਇਥੇ ਜਾਓ www.cancerconnection.ca ਜਾਂ www.cancer.ca, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-888-939-3333.

ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ (My Gut Feeling)

My Gut Feeling ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਕੈਂਸਰ—ਜਿਸਨੂੰ ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜਾਓ www.mygutfeeling.ca ਜਾਂ ਇਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-647-478-5414.

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਰੋਤ ਡੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। Pfizer ਗੈਰ-Pfizer ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।



Pr **Trazimera**[®]
trastuzumab

Pfizer Liaison

Patient Support Program

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋਣ

- ਅਦਾਇਗੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ
- ਬੀਮਾ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ
- ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ*
- ਇਲਾਜ ਜਾਣਕਾਰੀ

Pfizer Liaison ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਫੋਨ 1-844-616-6888; ਫੈਕਸ 1-844-636-6888; ਜਾਂ ਈਮੇਲ pfizerliaison@bayshore.ca



ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ mypfizer.ca ਉੱਤੇ ਜਾਓ



ਬੇਸ਼ੋਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮ (Bayshore Healthcare Ltd.) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

* ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ



TRAZIMERA® Pfizer Inc. ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧੀਨ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
Kadcyla® ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ F.Hoffmann-La Roche AG ਦਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧੀਨ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
© 2022 Pfizer Canada ULC. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।