MON TAPIS D'INJECTION DE G-CSF DE PFIZER

Avant votre injection, n'oubliez pas ce qui suit :

Passez en revue les directives détaillées de la section « Mode d'emploi » du feuillet de renseignements destinés au patient qui accompagne votre médicament pour savoir comment préparer et injecter la dose prescrite par voie sous-cutanée. Les directives présentées ici sont une version abrégée.

Sortez la boîte de la seringue du réfrigérateur et laissez-la atteindre la température ambiante pendant **30 minutes**.

Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon.

Examinez la boîte, les étiquettes, la seringue et le médicament à l'intérieur de la seringue.

ADMINISTRATION : *Les 7 étapes de votre injection sous-cutanée à l'aide de la seringue préremplie*

1. Nettoyez le point d'injection à l'aide d'un tampon imbibé d'alcool et laissez sécher la peau. Évitez d'injecter le médicament aux mêmes points que lors des dernières injections.



- Point d'auto-injection
- Utilisez ce point d'injection seulement si une autre personne vous injecte le médicament.

2. Retirez le capuchon de l'aiguille. Au besoin, consultez les directives détaillées pour vous assurer d'administrer la bonne dose.

3. Pincez la peau au point d'injection pour créer une surface ferme.

4. Continuez de pincer la peau. Introduisez l'aiguille dans la peau pincée à un angle de 45 à 90 degrés.

5. En exerçant une pression constante, enfoncez lentement et à fond la tige du piston.

6. Maintenez la tige du piston complètement enfoncée et retirez délicatement l'aiguille du point d'injection.

7. Au moment où vous lâcherez la tige du piston, le dispositif de protection de l'aiguille glissera par-dessus l'aiguille sur toute sa longueur et se verrouillera automatiquement. **Ne remettez pas le capuchon sur l'aiguille.**

Pour terminer : Jetez le capuchon de l'aiguille et la seringue usagée dans le contenant pour la mise au rebut des objets pointus et tranchants.

PRÉPARATION : *Rassemblez tout le matériel d'auto-injection recommandé.*

Tampon imbibé d'alcool

Tampon d'ouate ou gaze et pansement adhésif

S'il y a du sang après l'injection, placez un tampon d'ouate ou de gaze sur le point d'injection, puis appuyez dessus. Appliquez un pansement adhésif, au besoin.

Seringue préremplie

Vous aurez également besoin d'un contenant pour la mise au rebut des objets pointus et tranchants.

Notes :

© 2021 Pfizer Canada SRI.
Tous droits réservés.

PP-BIO-CAN-0033-FR

RÉVISÉ PAR CCPP

Pfizer