

介紹

NYVEPRIA™



 **Nyvepria™**
pegfilgrastim

 **Pfizer**

開始我的 NYVEPRIA 治療

開始任何新的治療方法，都可能是一項挑戰。本手冊旨在回答您的問題，協助您取得最佳治療效果。

請務必閱讀本手冊以大致了解 NYVEPRIA，記得隨身攜帶以幫助您更好地了解您的療程。此外，請務必坦誠地向醫療團隊告知您的治療情況。如果對治療計劃有問題或疑慮，請與他們溝通。

NYVEPRIA 的用途是什麼？



NYVEPRIA 用於治療嗜中性白血球低下 (nu-tro-peen-ee-ah)。嗜中性白血球低下患者的身體無法製造足夠的嗜中性白血球，而該病症可能是由癌症藥物造成的。嗜中性白血球低下是化療中最嚴重的常見不良反應。嗜中性白血球低下使身體更容易受到感染，並減低您的抵抗力。您的醫生決定為您開具 NYVEPRIA，以增加您的嗜中性白血球 (nu-tro-fils) 數量，進而助力對抗感染。

NYVEPRIA 的作用原理是什麼？

NYVEPRIA 並非化療，但可能會與化療聯合使用。NYVEPRIA 會刺激骨髓，使其產生白血球。為確保 NYVEPRIA 有效運作，醫生可能會要求您定期驗血，檢查您的白血球數量。請務必遵從醫生對該等測試的指示。

NYVEPRIA 有哪些劑型？



- 配備 BD UltraSafe Plus™ Passive 針帽的預裝填針筒，內含 6 mg/0.6 mL (10 mg/mL) 聚乙二醇非格司亭。
- NYVEPRIA 針筒柱塞和針套並非使用天然乳膠製造。*
- NYVEPRIA 預裝填針筒採雙層盒裝，可保護內裡的藥物。

* 臨床意義尚未可知。

我將如何接受 NYVEPRIA ?



NYVEPRIA 的建議劑量是皮下單次注射 6 mg/0.6 mL (一個預裝填針筒的含量) , 每次化療週期注射一次。



進行癌症化療後，請等待最少 24 小時再注射 NYVEPRIA。

錯過一次注射的話怎麼辦？



由於注射 NYVEPRIA 與下次進行癌症化療應該間隔兩週，如果您錯過一次注射，請先諮詢醫生，再補打之前的劑量。

如何注射 NYVEPRIA ?



您的醫生會決定您是否能夠自行進行皮下注射。NYVEPRIA 只應在醫生決定的當日注射，且不得在化療週期最後一次用藥後 24 小時內注射。



如果您為他人注射 NYVEPRIA，則必須先了解 NYVEPRIA，知道如何及何時注射 NYVEPRIA。

請參閱第 10–13 頁的使用說明，了解如何準備和注射 NYVEPRIA。

重要的安全資訊

接受 NYVEPRIA 之前，我應該了解哪些內容？

如果您對聚乙二醇非格司亭、惠爾血添、任何 NYVEPRIA 成分或其他使用大腸桿菌製造的產品過敏，則請勿使用 NYVEPRIA。如果您對本資訊有任何疑問，請諮詢您的醫生。

使用 NYVEPRIA 前，請告知醫療服務提供者您的完整醫療狀況，包括：

- 如注射位置出現隆起、腫脹或瘀青且無消退跡象，請告知醫生。注射位置有時候可能會發生問題。
- 如果您患有鎌狀細胞特質或鎌狀細胞疾病，請在接受治療前告訴醫生。如果腹部左上方或肩部末端疼痛，請立即告知醫生或護士。
- 如果您目前懷孕、計劃懷孕、疑似懷孕、或正在哺乳，請先諮詢醫生再使用 NYVEPRIA。

請告知醫療服務提供者您現時正在服用的所有藥物、維他命、礦物質、營養補充品及替代藥物。



重要的安全資訊

NYVEPRIA 可能的不良反應有哪些？

最常見的不良反應是骨痛和肌肉疼痛。疼痛通常可以透過服用非乙醯柳酸非處方止痛藥緩解。請諮詢您的醫生，了解最適合您的方法。

NYVEPRIA 可能造成的不良反應包括：

- **脾臟破裂**。使用 NYVEPRIA 時，您可能會出現脾臟脹大，甚至破裂的情況。脾臟破裂可能會致死。脾臟位於腹部的左上位置。如果您的腹部左上或左肩末端疼痛，請立即致電醫生。這種疼痛可能是脾臟脹大或破裂的跡象。
- 也可能出現**嚴重過敏反應**。這些反應可能會導致全身起疹、呼吸急促、喘鳴、血壓下降（一般會造成頭暈或眩暈）、口腔或眼部周圍腫脹、心跳加速或流汗。如果您在注射 NYVEPRIA 時出現過敏反應，請立即停止注射。**如果於任何時候發生嚴重過敏反應，請立即致電醫生或急症服務（例如致電 911）。**
- **低血小板計數（血小板減少）**，導致容易發生瘀青和出血增加。
- **急性呼吸窘迫綜合症 (ARDS)，一種嚴重肺部問題**。如果出現呼吸急促或呼吸困難症狀，請立即致電醫生或尋求急症治療。
- 接受 NYVEPRIA 注射的患者曾出現**腎損傷（腎小球性腎炎）**症狀。如果臉部或腳踝浮腫，尿中帶血或呈棕色，或排尿比平常減少，請立即致電醫生。
- **皮膚血管炎**，其症狀為皮膚表面的起疹，看起來可能像是紫色或紅色的斑點或腫塊、群集的小點、疹點或蕁麻疹。您也可能會感到皮膚痕癢。如果出現這些症狀，請告知醫療服務提供者。

- **毛細血管滲漏症候群**，可能出現的症狀為水腫、排尿減少、呼吸困難、腹部腫脹和飽腹感，以及疲勞感。如果出現這些症狀，請告知醫療服務提供者。
- 患有**鎌狀細胞特質或鎌狀細胞疾病**的患者使用聚乙二醇非格司亭可能會導致**嚴重的鎌狀細胞危象**。聚乙二醇非格司亭的母化合物惠爾血添也與嚴重的鎌狀細胞危象有關，某些個案中甚至可能致死。如果您患有鎌狀細胞特質或鎌狀細胞疾病，請務必在開始使用 NYVEPRIA 前告知醫生，討論潛在的風險和益處。
- **未成熟的骨髓細胞數量異常（骨髓增生異常綜合症）**，可能會導致癌症（急性骨髓性白血病），症狀為發燒、骨痛、呼吸困難、流血和疲勞感。*

某些患者可能會出現注射位置發紅、腫脹或痕癢的症狀。這可能是對 NYVEPRIA 成分的過敏症狀，或局部性反應。如果出現任何此類症狀，請致電醫生。

這些並非您在接受 NYVEPRIA 時可能感受到的全部不良反應。如果您遇到未在此處列出的任何不良反應，請致電您的醫療專業人員。

* 接受化療和/或放射療法的乳癌和肺癌患者出現的副作用

如何減低感染風險？

嗜中性白血球低下會增加感染風險。因此，使用 NYVEPRIA 時，以下措施有助避免感染：

1. 保持良好個人衛生



- **經常洗手**，尤其是進食前和上廁所後
- **隨身攜帶一小瓶消毒搓手液**，為雙手消毒
- **每天沖暖水澡**，不過避免水溫過熱，以免皮膚乾燥
- **使用柔軟的牙刷**清潔牙齒，避免刺激牙肉

2. 保護皮膚



- **使用保濕護膚液**，護理乾燥或裂開的皮膚
- **穿戴橡膠手套**洗碗、做清潔或園藝工作
- **切勿擠按或搔抓粉刺**
- **使用電剃刀**而非手動剃刀，避免割傷皮膚
- 熨衣或煮食時**小心燙傷**
- 使用溫水和肥皂**立即清潔割傷或刮傷**

3. 盡可能保持身體健康



- **好好休息**
- **飲食平衡**
- **攝取足夠水份**
- 盡可能經常**運動**
- **遠離任何患上感冒、流感或傳染病的人士**
- **避開人群**，如商場或巴士等
- **避免進食生蛋，生的或未煮熟的肉類、禽類、魚類和海鮮**
- **移除生活區域的植物**—活植物可能會是細菌來源
- **避免清潔貓砂盒或鳥籠**

識別和報告感染

NYVEPRIA 可以減低感染風險，但未必能完全防範感染。白血球量低下期間，仍有可能發生感染。記得向醫生或醫療團隊回報任何感染症狀。

最常見的部分感染跡象和症狀包括：

- 發燒和發冷
- 起疹、腫脹和發紅
- 喉嚨痛
- 腹瀉
- 割傷、潰瘍部位或切口流膿、發紅、腫脹或疼痛

服用任何退燒藥前，請先向醫療團隊確認。

實用 Web 資源

www.cancer.ca (加拿大癌症協會)
www.cancer.org (美國癌症協會)
www.standuptocancer.ca

使用說明

使用 NYVEPRIA 預裝填針筒


1) 從冰箱拿出預裝填針筒盒

- 從預裝填針筒外盒拿出預裝填針筒內盒。將預裝填針筒內盒置於乾淨且照明良好的平面上，並在室溫下放置 **30 分鐘**，然後再行注射。

- X** 切勿在預裝填針筒內盒受損的情況下使用預裝填針筒。
- X** 切勿嘗試使用熱水或微波爐等熱源加熱預裝填針筒。
- X** 切勿將預裝填針筒置於直射日光下。
- X** 切勿搖晃預裝填針筒。

2) 準備所有注射所需的器材，檢查藥物和預裝填針筒

- 使用水和肥皂徹底洗淨雙手。
- 將以下器材置於乾淨且照明良好的平面：
 - 酒精濕巾
 - 棉球或紗布
 - 膠布
 - 尖銳廢棄物容器
 - 預裝填針筒
 - 打開預裝填針筒內盒，手執針帽從預裝填針筒內盒拿出預裝填針筒。
 - 為安全起見：
 - X** 切勿緊握柱塞桿。
 - X** 切勿抓住針套。




- 確認預裝填針筒中的藥物透明無色。

- X** 切勿在以下情況下使用 NYVEPRIA 預裝填針筒：
 - 藥物混濁或變色，或包含薄片或粉狀物
 - 任意部分看似已裂開或受損
 - 預裝填針筒曾從高處落下
 - 灰色針套缺失或並未妥善裝上
 - 標籤上標記的有效日期已過

3) 準備

- 選擇注射位置



- 使用酒精濕巾清潔注射位置。等待皮膚乾燥。
- X** 切勿在注射前再次碰觸注射位置。
- 如果您想使用相同的注射位置，請確保與之前的注射點稍有偏離。
- X** 切勿注射於皮膚敏感、瘀青、發紅或變硬的部位。避免注射於有疤痕或皮膚擴張紋的位置。



手執針帽拿著預裝填針筒。小心朝遠離身體的方向，以直線方向拉開針套。將針套丟進尖銳廢棄物容器。**切勿重新套回針套。**

- X** 切勿在準備好注射之前打開預裝填針筒的針套。
- X** 切勿扭曲或彎折針套。
- X** 切勿手執柱塞桿拿著預裝填針筒。
- X** 切勿將針套裝回預裝填針筒上。

使用說明


4) 注射 NYVEPRIA

- 捏住注射位置，形成穩固的表面。



重要：注射期間請繼續捏住皮膚。

- 保持捏住狀態。以 45 至 90 度角將注射針插入皮膚。




- 緩慢並持續地施壓，將柱塞桿按到底。



- 針筒變空後，輕力將它從皮膚抽開。



- 放開柱塞時，針帽會自動滑過注射針，直至完全覆蓋注射針，且針帽鎖定到位。**切勿重新套回針套。**



重要：拿開針筒時，如果筒身內看來仍殘留藥物，代表並未注射完整劑量。請立即致電醫療服務提供者。

5) 檢查注射位置並丟棄針筒

- 如有出血，請用棉球或紗布按壓注射位置。**切勿**搓摸注射位置。如有必要，可在患處貼上膠布。
- 根據以下說明，遵照醫療服務提供者的指示丟棄針筒。當地法規可能對丟棄注射針和針筒設有特別規定。
 - 使用過的預裝填針筒應即時丟進尖銳廢棄物容器。**切勿**將針筒與家居垃圾一同丟棄。
 - 切勿將尖銳廢棄物容器置於兒童可以接觸到的位置。

請參閱患者資訊傳單的詳細「使用說明」，了解如何準備和注射 NYVEPRIA。

下一次預約的準備工作

如果您對自己的治療有任何疑問，請務必詢問並告知您的醫療團隊。在下面的空白處寫下您想在後續幾次造訪中向團隊提出的任何問題。

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

我的醫療團隊的聯絡方式

姓名：_____ 電話號碼：_____

姓名：_____ 電話號碼：_____



姓名：_____ 電話號碼：_____

姓名：_____ 電話號碼：_____

姓名：_____ 電話號碼：_____

我的注射追蹤表

下表有助您記住合適的注射位置。此外，為了避免重複注射於同一位置，請使用下頁的表格，助您記起上次的注射位置。溫馨提示，接受化療後須等待 24 小時，之後方可再使用 NYVEPRIA。例如，若是您的化療在日間進行，則可計劃於翌日傍晚注射 NYVEPRIA。



使用 NYVEPRIA 的患者可以透過 ClaimSecure 使用 **Pfizer G-CSF 電子補貼卡**！

請攜帶補貼卡到您光顧的藥房。本卡最多可補貼 **NYVEPRIA 價格的 30%**。

若為透過 ClaimSecure 處理付款的藥劑師，請使用以下資料：

- 第三方付款者：ClaimSecure
- Pfizer G-CSF 群組號碼：37327
- 憑證 ID：魁北克省居民 = 00002001NV
魁北克省以外加拿大居民 = 00001001NV
- 協調：最後付款者
- 關係代碼：CARDHOLDER

如果您有其他問題或希望了解更多資訊，請致電 1-800-461-6579 聯絡 ClaimSecure 藥房客戶支援部門。



Pfizer Liaison 患者支援計劃

為您提供相關資源，支援您的治療並補充您的醫療團隊提供的護理

- 費用核退導覽與評估
- 協調保險金
- 經濟援助*
- 治療資訊

要註冊加入 Pfizer Liaison，
請透過以下方式聯絡我們：

致電 1-844-533-0150；

傳真至 1-844-533-1151；

或傳送電子郵件至 pfizerliaison@rxinfinity.ca。



如欲了解更多資訊，請瀏覽 mypfizer.ca



* 無法保證提供經濟援助。



電子補貼卡使用條款

請保留您的 G-CSF 卡；只要醫師繼續處方適用藥物，或直至計劃終止為止，您將可繼續使用本卡。生產商可能酌情變更經濟援助金額。任何收集的個人資料均不會提供給藥物生產商或任何第三方。

BD UltraSafe Plus™ 是 Safety Syringes, Inc. 的商標。
母公司為 Becton, Dickinson and Company。
NYVEPRIA™ 是 Hospira, Inc. 的商標。經授權使用。
© 2022 Pfizer Canada ULC. 保留所有權利。
PP-NYV-CAN-0002-ZH-HK

